

# RACCOMANDAZIONI

## PER UNA MAGGIORE DIFFUSIONE DELLA VACCINAZIONE ANTI-PNEUMOCOCCICA TRA GLI ANZIANI E I FRAGILI

### POLITICHE VACCINALI




- I** Fornire **indicazioni precise su tipologia di vaccino** da utilizzare, modalità e tempistiche di somministrazione
- 2** Adottare la metodologia dell'HTA a supporto delle **politiche vaccinali**

### SISTEMI DI SORVEGLIANZA



- 3** Implementare l'**Anagrafe nazionale vaccini**
- 4** Inserire nei LEA un **indicatore di esito** della copertura vaccinale negli anziani
- 5** Individuare **obiettivi minimi perseguibili**, incrementali e sostenibili su cui basare i target di copertura

### PROCESSI ORGANIZZATIVI



- 6** Coinvolgere **farmacie e ospedali per ampliare l'accesso** alla vaccinazione, oltre a MMG e Dip. Prevenzione
- 7** Inserire la vaccinazione nelle **linee guida specialistiche** e nei **PDTA di patologia**
- 8** Implementare **campagne di vaccinazione sistematiche nelle RSA** e case di riposo
- 9** Dare **accesso all'anagrafe regionale a tutti gli attori** coinvolti nel processo vaccinale
- 10** **Destagionalizzare la vaccinazione**, sia stand-alone che in co-somministrazione con altri vaccini

### FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE



- 11** **Formare tutti gli operatori sanitari** in modo specifico e continuativo, nei corsi di laurea e nel post-laurea
- 12** Realizzare **campagne di comunicazione sociale** rivolte ad anziani e caregiver